

ZAMORA - VALLADOLID



2.68. PENILLANURAS-CAMPOS SUR

2.68.1. Descripción




El espacio incluye un sector de la comarca de Tierra de Campos (casi 24.000 has. en total) situado en el noreste de la provincia de Zamora, incluyendo también una reducida superficie de la provincia de Valladolid. El territorio está comprendido entre los ríos Cea y Valderaduey, tratándose de una llanura esteparia bastante uniforme de cultivos cerealistas de secano interrumpidos ocasionalmente por pequeñas extensiones de pastizal, matorral, pinares y encinares poco desarrollados. Una serie de arroyos forman pequeños valles en los que se conservan algunas alamedas. Este espacio protegido limita al sur con la ZEPA "Lagunas de Villafáfila" y al norte con la ZEPA "Penillanuras-Campos Norte".

2.68.2. Importancia ornitológica

El espacio protegido tiene interés para las aves esteparias, principalmente, Aguilucho Cenizo, Cernícalo Primilla, Sisón y Avutarda. También destaca la población reproductora de algunas especies de alaudidos que alcanzan altas densidades.

Especies significativas:

Aguilucho Lagunero: Área de cría habitual con tres parejas nidificantes en el año 1999. La zona también es utilizada durante el invierno y los pasos migratorios.



Código: ES0000207

Nombre: Penillanuras-Campos Sur

Provincia: Zamora - Valladolid

Superficie: 23.800 has.

Localidades de referencia:

Villalpando, Villanueva del Campo

Hábitats característicos:

Llanura cerealista

Especies por las que se declara ZEPA:

Aguilucho Cenizo, Avutarda, Sisón

Otras especies de interés:

Aguilucho Lagunero, Cernícalo Primilla, Ortega, Lechuza Campestre

Época aconsejada de visita:

Primavera

Casa del Parque - Centro de visitantes:

No tiene

Otras figuras de protección:

No tiene

Nombre	Hectáreas	% del municipio designado ZEPA	% de la ZEPA en el municipio
Bolaños de Campos (VA)	576	19	2,4
Quintanilla del Molar (VA)	498	34	2,1
Valdunquillo (VA)	923	30	3,9
Villavicencio de los Caballeros (VA)	316	9	1,3
Castrogonzalo (ZA)	1.039	42	4,4
Castroverde de Campos (ZA)	3.242	50	13,6
Cerecinos de Campos (ZA)	1.105	39	4,6
Fuentes de Ropel (ZA)	1.282	26	5,4
Prado (ZA)	1.090	100	4,6
Quintanilla del Olmo (ZA)	1.140	90	4,8
San Esteban del Molar (ZA)	2.503	100	10,5
Vega de Villalobos (ZA)	959	94	4,0
Vidayanes (ZA)	1.249	100	5,2
Villalobos (ZA)	4.318	100	18,1
Villamayor de Campos (ZA)	658	25	2,8
Villanueva del Campo (ZA)	2.357	59	9,9
Villardefallaves (ZA)	542	26	2,3

Aguilucho Cenizo: Área de reproducción con una estimación de 14-16 parejas en el 2002. Esta población tiene importancia a nivel internacional. La especie también es frecuente en paso migratorio.



Verderón Común (*Carduelis chloris*).

Cernícalo Primilla: Área de reproducción con una población de menos de 10 parejas en el año 1999. El espacio es utilizado como área de alimentación por grupos de cernícalos procedentes de colonias cercanas, tanto en la época de cría como en el periodo premigratorio.

Sisón: Área de cría tradicionalmente importante para la especie, donde parece que han disminuido bastante sus efectivos. En la actualidad la población nidificante se ha estimado en 150-200 machos reproductores. Hay datos en el pasado que estimaban la población en más de 200 machos y citaban concentraciones postnupciales superiores a los 1000 ejemplares. Esta población tiene importancia nacional, regional e internacional.

Avutarda: Área de reproducción con un censo de alrededor de 600 aves en el año 1998. La población nidificante tiene gran interés en el ámbito regional e importancia a nivel nacional e internacional.

Además, en la zona hay una reducida población reproductora de Ortega con una estimación de 4-6 parejas en el 2002. Presencia de una pareja de Halcón Peregrino, siendo más frecuente esta especie el resto del año, al utilizar el espacio como cazadero ejemplares migrantes,



Avutarda (*Otis tarda*).

invernantes y procedentes de otros territorios de cría cercanos. Posible nidificación de Aguilucho Pálido, siendo frecuente en migración e invernada. La Ganga Común ha desaparecido como nidificante en la zona con registros ocasionales en últimos años fuera de la época de cría.

Otras especies del Anexo 1:

Poblaciones reproductoras con interés de Calandria y Terrera Común. Nidificación de Lechuza Campestre en años favorables (abundancia de Topillo Campesino). Otras especies nidificantes son: Cigüeña Común, Milano Negro, Alcaraván, Chotacabras Gris, Martín Pescador, Cogujada Montesina, Totovía, Bisbita Campestre y Curruca Rabilarga. No se descarta la presencia de alguna pareja de Cigüeñuela. Invernada habitual de Milano Real y Esmerejón.

Otras especies:

La cercanía de este espacio a las Lagunas de Villafáfila proporciona que este territorio sea utilizado como área de alimentación de numerosos grupos de Anzar Común invernantes o en migración en la zona. Reproducción de Alcotán y Chorlitoje Chico.

Especie	Población	Criterios
Aguilucho Cenizo	14-16 parejas	B3
Sisón	150-200 machos	A1, C1, C6
Avutarda	600 aves	A1, B2, C1, C2, C6

Especies importantes, con sus poblaciones y criterios de importancia.



Ortega (*Pterocles orientalis*).